

Grille de lecture des coefficients et des écrits du dossier de soins

**Soins de Bases (Alimentation, Elimination, Locomotion, Hygiène et confort)**

	Coefficient 1 <b>Autonomie</b>	Coefficient 4 <b>Dépendance modérée</b>	Coefficient 10 <b>Dépendance majeure</b>	Coefficient 20 <b>Dépendance Totale</b>
		<b>Intervention dans au moins 2 groupes</b> (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)	<b>Intervention dans au moins 2 groupes</b> (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)	<b>Interventions dans tous les groupes</b> (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)
	<b>Intervention ponctuelle</b>	<b>Intervention ponctuelle</b>	<b>intervention permanente</b>	<b>intervention permanente</b>
	Recueil de données	Soins occupationnels		Suppléance totale dans tous les groupes
<b>ALIMENTATION</b>	Collation  Surveillance alimentaire  Repas : recueil du choix du menu, installation et distribution	Alimentation et installation pour biberon et/ou seins Administration d'alimentation (4 repas)  Installation préparation et démonstration tire lait  Administration d'alimentation (5 repas) Administration d'alimentation (6 repas) Complément de biberon	Administration d'alimentation (8 repas) Boissons fréquentes Alimentation par sonde Installation et préparation du repas (couper viande, peler fruit, ouvrir pot,	
<b>ELIMINATION</b>		Mise sur le pot	Lavement évacuateur type Normacol	
<b>LOCOMOTION</b>			Aide lever, le transfert, la mise au fauteuil, à la marche (1 aide) réinstallation avec 2 personnes, mobilisation avec lève malade	Alité permanent, changements de position fréquents(7fs/24h) (y compris le repos strict prescrit)  Aide pour le lever, la marche, le fauteuil ( 2 aides)
<b>HYGIENE ET CONFORT</b>	Réfection du lit	Bain fait par la maman  Désinfection rhino-pharyngée 1 fois/jour  Aide à l'habillage et déshabillage	Bain fait par le personnel  Désinfection rhino-pharyngée 6 f/j  Prévention d'escarres + changement position x 6  Toilette complète, douche prévention d'escarres petits soins d'hygiène + de 4 fois/24h Habillage déshabillage Douche bétadinée	Toilette complète  Changes (+ de 6/24h)  Prévention escarres (+ de 6 /24h) Toilette mortuaire

Grille de lecture des Coefficients et des écrits du dossier de soins

**Soins Techniques (Prescriptions, Surveillances, Suivi de Protocoles médicaux)**

Coefficient 1 <b>Prédominance de soins légers</b>	Coefficient 4 <b>Prédominances de soins légers ou courts &lt; 6/j</b>	Coefficient 10 <b>Prédominance de soins lourds ou courts et répétés &gt; 6/j</b>	Coefficient 20 <b>Prédominance de soins très lourds</b>
Température	Injections (IM-IV-SC-ID) Utilisation d'ENTONOX ou de saccharose	Pose de lunettes à O2 et surveillance	Réanimation
Mensurations	Médicaments (per-os de façon ponctuelle) Aérosol 4 fois/jour	Préparation pour le bloc	Intubation
Surveillance nuit -première et suivante(s) éventuellement-	Perfusion (surveillance renouvellement et ablation) Pansement simple  Hémocultures  E.C.C.B.U.  Vessie de glace Aspiration sonde gastrique Aspiration nasale jusqu'à 4 fois/j  Soins de bouche  Surveillance de plâtre Surveillance vomissements Soins de siège et application de traitement Essai alimentaire	Pose de sonde gastrique  Porteur de sonde de gastrostomie  Alimentation par sonde gastrique, par sonde de gastrostomie  Alimentation parentérale Ablation de cathéter  Surveillance hydratation Redon (mesure, refection et change)	Surveillance continue Assistance respiratoire  Pansements très lourds et répétés >3 fois /24 heures
	<b>Prédominances de soins légers fréquents &lt; 6 fois / 24 h</b>	<b>Prédominances de soins légers fréquents &gt; 6 fois / 24 h</b>	
	Dextro x3 Saturation d'oxygène x 8  Température x 6	Surveillance de scope x 8 Surveillances des contantes >8 fois Aérosol 6 à 8 fois/jour Aspiration nasale 6 à 8 fois/jour	

Grille de lecture des Coefficients et des écrits du dossier de soins

**Soins Relationel et éducatifs (Relation, informations, éducations)**

	Coefficient 1 <b>Autonomie</b>	Coefficient 4 <b>Dépendance modérée</b>	Coefficient 10 <b>Dépendance majeure</b>	Coefficient 20 <b>Dépendance Totale</b>
<b>RELATIONS</b>	Recueil de données	Incitation à l'expression et écoute du patient et/ou de la famille	Accompagnement enfant < 2 ans	Accompagnement majeur du patient ou de sa famille
	Entrée Sortie (information par rapport au suivi) Labstix	Prise en charge de l'anxiété, de la solitude, de la séparation  Surveillance comportement chez l'enfant  Surveillance du lien mère-enfant	Accompagnement psycho social, prise en charge complexe du devenir  Reconstruction de l'image de soi  Difficultés majeures de communication avec prise en charge (réexplication reformulation)  Aide dans des situations de relation difficile (dépression anxiété, désorientation, démence)	Communications non verbales : stimulation verbale et/ou gestuelle pour reprise de conscience  Agitation extrême, désorientation temporaire difficile  Accompagnement psycho social, prise en charge complexe du devenir  Relation d'aide
<b>INFORMATIONS</b>	Information succincte et ponctuelle  Observation des comportements	Apprentissage des gestes d'hygiène Conseils et éducations hygiène de vie Surveillance d'auto soins 1 fois/jour	Annonce de diagnostic difficile,  Stimulations fréquentes pour la reprise de conscience	
<b>EDUCATIONS</b>		Education par rapport au sevrage  Education par rapport à l'asthme  Education par rapport aux suites d'une intervention Education par rapport à l'allaitement Education par rapport à un régime	Apprentissage des autos soins par le patient et/ou sa famille < à 4 fois  Surveillance d'autos soins > à 1 fois  Surveillance et éducation dans les situations d'addiction Reconditionnement urinaire et fécal	Apprentissage d'auto soins du patient et/ou de la famille > ou = à 4 fois/jour