

<b>FONCTION DE SOINS</b>	<b>COEFFICIENT 1</b>	<b>COEFFICIENT 4</b>	<b>COEFFICIENT 10</b>	<b>COEFFICIENT 20</b>
<p><b><u>SOINS DE BASE</u></b></p> <p>Groupe de soins :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentation</li> </ul>	<p><b><u>AUTONOMIE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Repas : recueil du choix du menu, installation et distribution</li> </ul>	<p><b><u>DEPENDANCE MODEREE</u></b></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Aide ponctuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boissons ≤ 6 / 24 h</li> <li>- Restriction hydrique</li> </ul>	<p><b><u>DEPENDANCE MAJEURE</u></b></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Aide permanente ou réalisation de la quasi totalité des soins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boissons &gt; 6 / 24 h</li> </ul>	<p><b><u>DEPENDANCE TOTALE</u></b></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Suppléance totale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reprise alimentation post réanimation</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Locomotion mobilisation</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation</li> <li>- Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil, la douche, la toilette, le déshabillage, l'habillage (1aide)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil (2 aides)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alitement permanent</li> <li>- Changements de position fréquents</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elimination</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation sur le bassin (ou mise à disposition de l'urinal)</li> <li>- Change de stomie</li> <li>- Penilex : pose et surveillance. Vidange de poche</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hygiène et confort</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfection du lit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Change &lt; 4 fois par 24h pour incontinence</li> <li>- Petits soins d'hygiène <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soins de bouche</li> <li>- Soins d'yeux</li> </ul> </li> <li>- Bas anti thrombose : pose et surveillance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toilette au lit</li> <li>- Change 4 à 6 fois par 24h pour incontinence</li> <li>- Prévention d'escarres</li> <li>- Capiluve et pédiluve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Change &gt; 6 fois par 24 h pour incontinence</li> <li>- Prévention d'escarre &gt; 6 fois par 24 h</li> <li>- Toilette complète au lit</li> <li>- Toilette mortuaire</li> </ul>

<u>SOINS</u>	<u>SOINS LEGERS</u>	<u>SOINS COURTS</u>	<u>SOINS LOURDS</u>	<u>SOINS TRES LOURDS</u>
<p><b><u>TECHNIQUES</u></b> (Prédominance de soins)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prélèvements (sang et/ou urine) ou injections ≤ 4 / 24 h dont <b>ECBU/ hémocultures</b></li> <li>- Surveillance des constantes ≤ 4 / 24 h (pouls, TA, température, saturation en O2, fréquence respiratoire)</li> <li>- Surveillance poids et taille</li> <li>- Surveillance de la douleur (EVA)</li> <li>- Glycémie capillaire</li> <li>- Diurèse</li> <li>- Bandelette urinaire</li> <li>- Quantifier les entrées et comptabiliser les sorties (Bilan entrée sortie)</li> <li>- Médicaments per os : distribution et aide a la prise</li> <li>- E.C.G</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prélèvements ou injections : 4 à 6 / 24 h</li> <li>- Surveillance des constantes 4 à 8 / 24 h</li> <li>- <b>Perfusion simple (pose, surveillance, retrait)</b></li> <li>- <b>Cathétérisme veineux (post Ponction Biopsie Hépatique (PBH) et/ou jugulaire)</b></li> <li>- Surveillance vomissements</li> <li>- Pose et surveillance de sonde naso gastrique</li> <li>- Pose et surveillance de sonde vésicale</li> <li>- Surveillance post-endoscopie, radio fréquence</li> <li>- Surveillance drain (irrigation)</li> <li>- ponction</li> <li>- Aérosol</li> <li>- Aide pour ponction - biopsie et surveillance</li> <li>- <b>Pansement simple :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Point de ponction.</li> <li>- Escarre locale</li> <li>- Médiane</li> <li>- Perfusion</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Médicaments per os : distribution et aide a la prise &gt; 6 / 24 h</b></li> <li>- <b>Port à Cath (PAC) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préparation</li> <li>- Pose et retrait aiguille</li> <li>- Surveillance</li> </ul> </li> <li>- <b>PICCligne :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveillance</li> <li>- Retrait aiguille</li> </ul> </li> <li>- Transfusion de plaquettes, albumine ou facteurs immunoglobuline</li> <li>- <b>Pansement complexe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Escarre locorégional</li> <li>- Cathéter central</li> <li>- Drain</li> <li>- Port à Cath (PAC)</li> </ul> </li> <li>- Pose de sonde naso gastrique</li> <li>- Alimentation entérale</li> <li>- Pose de sonde vésicale</li> <li>- Stomie change poche et socle</li> <li>- Surveillance chimiothérapie</li> </ul> <p><u>Soins légers et courts répétés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveillance constantes &gt; 8 / 24 h</li> <li>- Injections répétées &gt; 6 / 24 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Médicaments per os : distribution et aide a la prise toutes les heures</b></li> <li>- Perfusion lourde + diurèse + surveillance constantes I heure</li> <li>- <b>Port à Cath (PAC)/ PICC line :</b> Prélèvements et/ou injection</li> <li>- <b>Retrait cathéter central</b></li> <li>- <b>Pansements lourds</b> et / ou répétés &gt; 3 / 24 h <ul style="list-style-type: none"> <li>- Escarre généralisée</li> <li>- PAC</li> <li>- KT central</li> </ul> </li> <li>- Transfusion sang</li> <li>- Aspirations itératives</li> <li>- Assistance continue</li> <li>- <b>Prise en charge de l'urgence vitale (hémorragie digestive)</b></li> </ul>

<u>SOINS</u>	<u>AUTONOMIE</u>	<u>DEPENDANCE MODEREE</u>	<u>DEPENDANCE MAJEURE</u>	<u>DEPENDANCE TOTALE</u>
<p><b><u>RELATIONNELS</u></b>  <b><u>ET EDUCATIFS</u></b>            (Personne soignée et /ou la famille)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information succincte et ponctuelle (<b>accueil du patient, avant et au retour d'examens</b>)</li> <li>- Instruction sur un problème de santé, un régime</li> <li>- Observation des comportements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reformulation et explications</li> <li>- Informations d'aide contre :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'anxiété</li> <li>- la solitude</li> <li>- la vie hospitalière</li> </ul> </li> <li>- Relation d'aide a la vie quotidienne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aide dans les situations et relations difficiles : dépression, angoisse majeure</li> <li>- Stimulations fréquentes pour reprise de conscience</li> <li>- Apprentissage de nouveaux comportements, d'auto - soins a la personne soignée ou a la famille :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Education antalgique, anti émétique</b></li> <li>- <b>Education du diabète</b></li> <li>- <b>Education thérapeutique</b></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accompagnement en situation de crise du patient :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- désorientation,</li> <li>- agitation extrême,</li> <li>- décès</li> </ul> </li> <li>- <b>Prise en charge et accompagnement du patient en fin de vie</b></li> <li>- <b>Infirmière d' Annonce (IDA)</b></li> <li>- <b>Soins palliatifs</b></li> </ul>