

Grille de lecture des coefficients en Médecine : (tous les 7 jours et à la sortie)

Fonction de soins	Coefficient 1	Coefficient 4	Coefficient 10	Coefficient 20
<p>Soins de base</p> <p><i>Groupe de soins</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentation • Elimination • Hygiène et confort • Locomotion 	<p><u>Autonomie</u></p>	<p><u>Dépendance modérée dans au moins 2 groupes de soins</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aide ponctuelle ou occasionnelle, mettre le matériel à disposition • <u>Toilette partielle</u> : <ul style="list-style-type: none"> - au lit - au fauteuil - au lavabo - dans la salle de bains <ul style="list-style-type: none"> • <i>installation</i> - au lavabo - au lit, pour une personne qui la fait seule - à la douche ou au bain. <ul style="list-style-type: none"> • <i>aide ponctuelle</i> - dos : 1f/jour - et/ou partie intime 1f/jour - et/ou coiffer - et/ou hygiène dentaire <ul style="list-style-type: none"> • <i>aide occasionnelle</i> • <i>nelle</i> - pédiluve - capiluve - petits soins d'hygiène, rasage <p>(- de 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pose étui pénien 1/24 h • Mise en place des matelas anti-escarres <ul style="list-style-type: none"> • Massages de confort • Contrôle de l'élimination, vidange de la poche à urines • Installation (1 personne) – incitation <ul style="list-style-type: none"> • Soins de l'apparence (maquillage, coiffure) • Pesée fréquente avec 2 aides • petits repas fractionnés 	<p><u>Dépendance majeure dans au moins 2 groupes de soins</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aide permanente ou réalisation de la quasi-totalité des soins • Boissons fréquentes > 8 fois • Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil, installations répétées • Prévention d'escarres (1 à 7 fois/24 heures) • <u>Toilette complète</u> : <ul style="list-style-type: none"> - au lit - au lavabo - au bain - à la douche ▪ <i>installation</i> <ul style="list-style-type: none"> - réalisation de la toilette du visage avec le rasage - toilette du torse - toilette intime - soin de bouche simple - coiffage - toilette des membres inférieurs en fonction des besoins • installation sur chaise percée, urinal à demeure, étui pénien, changes (6 fois maximum/24 heures), accompagner aux toilettes 	<p><u>Dépendance totale dans au moins 2 groupes de soins</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suppléance totale • Alitement permanent • Changes fréquents • Changements de position fréquents (+ de 7 fois/24 h) • Prévention d'escarres (+ de 6 fois /24 h) • Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil (2 aides), mobilisation avec lève malade. • <u>Toilette complète, intervention de 2 aides et notion de fréquence, le patient ne participe pas</u> <ul style="list-style-type: none"> - au lit - au chariot douche ▪ <i>installation</i> : <ul style="list-style-type: none"> - réalisation de la toilette entière - intervient la notion de 2 aides et/ou la fréquence en raison de l'incontinence de la sueur, etc. • <u>Toilette mortuaire</u> • surveillance diurèse horaire

Fonction de soins	Coefficient 1	Coefficient 4	Coefficient 10	Coefficient 20
Soins relationnels et éducatifs (personne soignée et/ou la famille)	Autonomie : pas plus de 2 items <ul style="list-style-type: none"> ● Accueil et installation ● Information succincte et ponctuelle <ul style="list-style-type: none"> ● Observation des comportements ● Entretien ● Conseils et explications des gestes élémentaires d'hygiène ● instruction sur un problème de santé, un régime, un traitement ● Action éducative ponctuelle ● Informations, conseils, stimulations ponctuels ● Soutien psychologique occasionnel ● Vérification des acquis 	Dépendance modérée: intervention ponctuelle (pas plus de 3 interventions sur les 7 jours) <ul style="list-style-type: none"> ● Informations, conseils stimulations fréquentes ● Incitation à l'expression et écoute <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge de : l'angoisse, la solitude, de la séparation, de l'avenir ● Resocialisation ● Aide à la pratique de ses croyances ● Incitation à prendre soin de son apparence ● Education pour les soins d'hygiène corporelle ● Expliquer la vie pratique de la structure ● Relation d'aide à la vie quotidienne <ul style="list-style-type: none"> ● Surveillance des comportements ● Conseil d'éducation sexuelle ● Ré apprentissage de la socialisation, de l'intégration dans un groupe ● Aide à la formation, à la culture générale <ul style="list-style-type: none"> ● Surveillance d'auto – soin 1/24 h ● Apprentissage des aides techniques <ul style="list-style-type: none"> ● Action éducative fréquente > 1/j ● Education nutritionnelle 	Dépendance majeure : interventions fréquentes ou intenses qui n'entraînent pas une surveillance continue <ul style="list-style-type: none"> ● Reconstitution de l'image de soi ● Difficultés majeures de communication avec prise en charge (ré explications, re formulations) ● Accompagnement du dépressif ● Guidance du patient (espace, temps, troubles cognitifs) ● troubles mineurs du comportement (opposition) entraînant une prise en charge relationnelle répétitive ● Re conditionnement urinaire et fécal ● Ré apprentissage d'une vie sexuelle en tenant compte des déficiences <ul style="list-style-type: none"> ● Apprentissage des auto – soins < 4/24 h ● Surveillance des auto – soins > 1/24 h <ul style="list-style-type: none"> ● Aide éducative importante (4/j) ● Stimulations importante (4/j) ● Soutien psychologique important (4/j) ● Surveillance particulière (patient suicidaire, comportement dangereux) 	Dépendance totale : intervention majeure ou aiguë ou continue <ul style="list-style-type: none"> ● Communication non verbale : stimulation verbale et/ou gestuelle pour reprise de conscience <ul style="list-style-type: none"> ● Accompagnement majeur du patient et/ou famille (soins palliatifs)(annonce d'un diagnostic grave) (perturbation de l'image corporelle) ● Surveillance continue liée au risque de fugues et/ou activités occasionnelles continues liées à la fugue (Alzheimer...) ● Soins face au refus du handicap ● Soins compliqués par des troubles majeurs du comportement ● Impossibilité de comprendre la situation <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge totale en l'absence d'un tiers <ul style="list-style-type: none"> ● Apprentissage des auto – soins > 4/24 h ● Accompagnement en situation de crise ● Contention d'un malade agité et surveillance ● Soutien psychologique très important et/ou en continu

Fonction De soins	Coefficient 1 < 10 mn	Coefficient 4 < 40 mn	Coefficient 10 De 60 à 120 mn	Coefficient 20 De 120 à 190 mn et au delà
Soins techniques	<p><u>Soins légers</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prélèvements (gaz du sang, prélèvements sanguins, hémocultures) ou injections 1 à 4 / 24 h ● Surveillance des constantes (TA, pouls, conscience, poids, diurèse) < 3 / 24 h ● Médicaments per os distribution et aide à la prise, distribution par la sonde gastrique ● Soins de bouche médicamenteux ● Instillation oculaire <ul style="list-style-type: none"> ● E.C.G ● vidange poche stomie, changement de poche. ● premier lever 	<p><u>Soins courts</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prélèvements répétés > 4 / 24 h <ul style="list-style-type: none"> ● Injections : 4 à 6 / 24 h ● Perfusion simple et surveillance (perfusion de base et antibiotiques <ul style="list-style-type: none"> ● Pose de cathétérisme veineux ● Surveillance des constantes 4 à 8 / 24 h ● Surveillance de drains, de sonde (pose, surveillance, ablation) <ul style="list-style-type: none"> ● Aérosols 4 / j <ul style="list-style-type: none"> ● soins pré - opératoires ● Aide pour ponction, biopsie ● Soins de bouche complexes (difficulté d'ouverture de risque de fausse route) <ul style="list-style-type: none"> ● Pose d'une S.A.D. ● Sondage vésical évacuateur difficile (obésité, spasticité) ● Aide à la prise des médicaments chez une personne difficile ● Surveillance d'urétérostomie et de cystocath <ul style="list-style-type: none"> ● Soins périnéaux ● Evaluation du résidu post-mictionnel ● lavement évacuateur +/- extraction d'un fécalome ● toilette gynécologique thérapeutique <p>● <u>Pansement simple :</u></p> <p>(pansements de kit de gastrostomie, plaies chroniques bourgeonnantes, pansements de KTC.)</p> <p>Nettoyage au sérum physiologique et/ou antiseptique. Tulle gras, compresses sèches ou pansement colloïde. Bain thérapeutique simple et aide au passage de pommades.</p> 	<p><u>Soins lourds</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Irrigation continue <ul style="list-style-type: none"> ● trachéotomie ● Ponction complexe ● Sondes naso-gastriques <ul style="list-style-type: none"> ➢ 4 / 24 h (nutrison) ● Aide à ponction pleurale ● Pose de produits sanguins ● Lavages vésicaux répétés ● Evacuation manuelle des selles ● Chimio-thérapie " simple " (un seul antimétabolite) <ul style="list-style-type: none"> ● Perfusions complexes (CERESYME, TEGELINE...) <p><u>Soins légers et courts répétés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Surveillance constantes > 8/24h <ul style="list-style-type: none"> ● Injections, perfusions <ul style="list-style-type: none"> ➢ 6 / 24 h ● Hétéro-sondages > 5 / 24 h <p>● <u>Pansements complexe :</u> (plaies chroniques, Puffigoïde bulleuse ...)</p> <p>- <u>I/</u></p> <p>Bain thérapeutique de corps entier ou de jambes ou de pieds et curetage ou décapage mécanique.</p> <p>- <u>II/</u></p> <p>Gestion de la douleur : EMLA, XYLOCAINE. Trempage avec curetage ou décapage. Nettoyer au sérum physiologique. Réalisation du pansement.</p> <p>- <u>III/</u></p> <p>Bain thérapeutique. Gestion de la douleur. Comptage des bulles. Traitement des excoriations. Pansements des plaies à vif</p> <p>Evaluation de la douleur (EVA)</p>	<p><u>Soins très lourds</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perfusion lourde (perfusion nécessitant une longue préparation et / ou demandant une surveillance de constantes répétitives) + diurèse <ul style="list-style-type: none"> ● diurèse horaire ● Surveillance constantes / heure ou > 10 sur un temps donné <ul style="list-style-type: none"> ● transfusions ● Aspirations itératives ● Assistance continue ● Ré éducation mictionnelle ● Sondage urinaire itératifs > 3/jour <ul style="list-style-type: none"> ● Soins liés à la sexualité ● Chimio-thérapie " lourde " plusieurs antimétabolites et surveillance <p>● <u>Pansements lourds et répétés</u> <u>3/ 24 h</u> (lympho-œdème suintant, plaies chroniques surinfectées suintantes, pansements répétés sur la journée, pansement avec +/- perte de substance...)</p> <p>- <u>I/</u></p> <p>Bain thérapeutique de jambes ou de corps entier avec curetage ou décapage mécanique Prise en charge de la douleur Pansements répétitifs sur les 24 heures</p> <p>- <u>II/</u></p> <p>Plus de plaies Gestion de la douleur à l'ENTONOX Décapage ou curetage mécanique Nettoyer Réalisation du pansement</p> <p>- <u>III/</u></p> <p>Pansements répétitifs sur les 24 heures, quand les plaies suintent beaucoup et ou lorsqu'une grande surface corporelle est atteinte.</p> <p>Evaluation de la douleur (EVA)</p>